

# INFORMASI UMUM

F.1.13/032/A/2024



## PERAWATAN LUKA OPERASI TANPA ADHESIVE TAPE



### Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi - Jakarta  
Telp: (Hunting) 021 568 4093 - 021 568 1111 - 021 568 4085  
Fax 568 4130 E-mail: [info@pjnkh.go.id](mailto:info@pjnkh.go.id)  
<http://www.pjnkh.go.id>

# PERAWATAN LUKA OPERASI TANPA ADHESIVE TAPE



## Prosedur

- Siapkan trolley untuk ganti balutan, yaitu dressing set steril, sarung tangan steril, sarung tangan non steril, masker, gunting, plaster, neirbeken (bengkok), NaCl 0.9% 25 cc, cairan antiseptik topikal (Povidone Iodine konsentrasi <1% atau Octenidine hydrochloride 0,1% atau Polyaminopropyl Biguainide 0,1%)
- Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
- Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan pada pasien
- Buka pakaian pasien di daerah sekitar luka
- Kaji kebersihan balutan luka dengan cara inspeksi, Jika:
  - a. Balutan luka bersih maka balutan dibuka setelah 48 jam dari tindakan operasi
  - b. Balutan luka kotor, seperti ditemukan noda diatas balutan, maka lakukan perawatan luka sesuai prosedur
- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- Pakai masker selanjutnya sarung tangan non steril
- Buka balutan dengan perlahan, dengan cara satu arah dari atas ke bawah dan gulung balutan ke arah bagian luar selanjutnya tempatkan pada neirbeken (bengkok)
- Kaji kondisi luka (warna dasar luka, dimensi luka, apakah ada eksudat dan nyeri)
- Buka sarung tangan non steril, buang ke neirbeken (bengkok)
- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- Buka dressing set steril dan tuangkan NaCl 0,9% 25 ml kedalam kom kecil, dan siapkan antiseptik topikal
- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah



- Pakai sarung tangan steril
- Bersihkan luka menggunakan kassa steril yang sudah dilembabkan cairan NaCl 0,9% dengan cara satu arah dari atas ke bawah dan ulangi sampai bersih
- Oleskan/semprotkan antiseptik topikal pada luka insisi dan luka yang masih terdapat benang dan alat kesehatan lain yang terpasang pada tubuh pasien
- Bilas sampai bersih dengan kassa yang sudah diberikan cairan NaCl 0,9% sesuai antiseptik topikal yang digunakan.
- Keringkan luka dengan memakai kassa steril dengan cara satu arah dari atas ke bawah
- Tutup luka dengan kassa steril dan berikan plester. Jika kondisi luka baik, setelah 5 hari tidak perlu ditutup plester.
- Tutup pakaian pasien, selanjutnya beritahu pasien bahwa tindakan sudah selesai
- Rapihkan peralatan yang sudah digunakan.
- Lepaskan sarung tangan steril ke tempat sampah infeksius
- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- Lepas masker dan buang ke tempat sampah infeksius
- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- Dokumentasikan pada Elektronik Medical Record (EMR) Kondisi Luka berupa naratif dan gambar
- Lakukan perawatan luka setiap hari setelah 48 jam.
- Berikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan atau keluarga tentang perawatan luka di rumah ketika pasien sudah diperbolehkan pulang kerumah.

